



가정통신문

부서담당: 보건교사 유주희
전화번호: TEL: 021) 6493-9606
FAX: 021) 6493-9600
홈페이지: <http://www.skoschool.com>

中國 上海市 閔行區 華漕鎮 聯友路 355號 (郵)201107 ☎ 보건실 6493-9606

학부모님, 안녕하십니까?

최근 단체생활을 하는 어린이를 중심으로 백일해, 마이코플라스마 폐렴 환자 발생이 증가하고 있고, 인플루엔자 유행이 지속되고 있어 호흡기 감염병 예방수칙을 안내합니다.

	백일해(법정감염병 제2급)	마이코플라스마 폐렴	인플루엔자(독감)
증상	발작적 기침, 기침 후 구토, 무호흡 등	발열, 두통, 인후통, 기침 등	두통, 근육통, 기침, 콧물, 인후통, 설사, 메스꺼움 등
예방 접종	생후 2·4·6개월(기본3회), (추가3회) 생후15~18개월· 만4~6세· 만11~12세	현재 개발된 백신은 없음	생후6개월~13세 어린이 (2010.1.1.~2023.8.31.출생) 지원접종:(2회 접종대상자) ※ 법정전염병 (접종 강제성 없음)
예방 관리	올바른 손씻기 생활화하기, 기침예절 실천하기(기침 등 유증상 시 마스크 착용), 주기적으로 환기하기, 의심 증상 발생시 신속한 진료·치료받기, 전염기간 동안 등원·등교하지 않기, 예방접종 참여하기 등 호흡기 감염병 예방수칙을 준수		

마이코플라즈마 폐렴이란?

마이코플라즈마 폐렴균에 의한 급성 호흡기 감염증으로 연중 발생 가능하지만 4~7년 주기로 유행하고, 주로 늦가을~초봄에 유행합니다.(가장 최근 유행 :2019년)
감염초기 발열, 두통, 인후통이 나타나고 이어서 기침이 2주이상 지속됩니다.(보통3~4주간 지속)
일반적인 감기 증상과 비슷하여 자연적으로 회복되지만
일부 **중증으로 진행되어 폐렴등을 유발**할 수 있습니다.(환자의 3~13%가 폐렴으로 진행)
감염경로는 환자의 기침이나 콧물 등 호흡기 분비물의 비말전파 또는 직접 접촉을 통해 감염 증상이 발생한 후 20일까지 전파가 가능하므로 예방수칙 준수가 중요합니다.

일상 예방 수칙	 흐르는물에 비누로 30초이상 손씻기	 기침이나 재채기는 입과 코를 가리기	 씻지 않은 손으로 눈코입 만지지 않기	 호흡기 증상시 진료 및 휴식하기	 증상이 있는동안 사람 많은곳 피하기	 환자와 수건 물컵등 구분하여 사용하기
----------------	--	---	---	--	--	---

2023. 11. 20.

상 해 한 국 학 교 장(직인생략)